

Odontoma Compuesto con Impactación de Canino Superior

Composite Odontoma with Upper Canine Impaction

Pablo Cordero Ortiz^{1*}

¹ Investigador independiente, Ecuador

*pablocortiz.34@gmail.com

Previo análisis clínico y radiográfico, se realiza intervención de cirugía oral bajo anestesia local. Se realiza asepsia y antisepsia, se utiliza anestesia local tipo lidocaína 2% con epinefrina 1:80000 (2 cartuchos, 1,8ml cada uno), mediante técnica infiltrativa local en fondo de vestíbulo y en mucosa palatina de zona a intervenir hasta lograr eliminación de conducción dolorosa; luego se realiza colgado de tipo trapezoidal, con descarga mesial y distal e incisión surcular, levantamiento de colgajo a espesor total, exodoncia de diente 24, eliminación completa de odontoma de tipo compuesto que impedía correcta erupción de diente 23. Se realiza inspección de alveolo y lecho quirúrgico, lavado con solución salina de Cloruro de Sodio al 9%. Se realiza colocación de botón en diente 23 para tracción ortodóntica y se realiza amarre en arco de ortodoncia fija del paciente. Por último, se realiza recolocación de tejidos en la posición inicial con técnica de sutura a puntos simples (seda 3/0). Se realiza hemostasia mediante compresión con gasas, se indican cuidados posoperatorios y medicación con:

- Amoxicilina 500mg tabletas #21. Vía oral 1 cada 8 horas por 7 días
- Meloxicam 15mg tabletas #4. Vial oral 1 cada día por 4 días
- Acetaminofen 1gr tabletas #12. Vía oral 1 cada 8 horas por 4 días



Fig. 1

1 Fuente de Financiamiento

Este estudio es autofinanciado.

2 Conflicto de Intereses

No existen conflictos personales, profesionales, financieros de otro tipo.

3 Consentimiento Informado

Los autores cuentan con el consentimiento informado de los pacientes para la investigación, la publicación del caso y sus imágenes.

Recibido: 10 de septiembre de 2021

Aceptado: 25 de noviembre de 2021

